

Предлагаем Вам наиболее важные рекомендации по приёму препарата **Долормин для детей**. Нижеследующая информация действительна исключительно в случае назначения препарата детям.

Подробную информацию о приёме данного препарата Вы можете получить, прочитав немецкую инструкцию по применению или обратившись к врачу или фармацевту.

Препарат можно приобрести без рецепта. Для достижения максимально успешного эффекта лечения необходимо принимать **Долормин для детей, 2% суспензию ибупрофена**, строго по предписанию.

Долормин для детей, 2% суспензия ибупрофена

Состав:

В 5 мл суспензии содержится 100 мг ибупрофена.

Прочие ингредиенты: Ацесульфам калия, глицерол, бензоат натрия, полисорбат 80, сахароза, кукурузный крахмал, очищенная вода, ксантановая смола, лимонная кислота (Ph. Eur.), краситель Аллюра красный (E 129), ароматизаторы. 5 мл суспензии содержит около 0,13 ХЕ.

Долормин для детей выпускается в упаковках по 100 мл суспензии.

1. Что такое **Долормин для детей** и каковы показания для его применения?

Долормин для детей – это болеутоляющее, противовоспалительное и жаропонижающее средство (нестероидное противовоспалительное и анальгетическое средство).

Долормин для детей принимается при:

- слабых и умеренных болях, таких, как головная и зубная боль.
- повышенной температуре.

2. Что необходимо учитывать перед приёмом или назначением **Долормина для детей**?

Долормин для детей противопоказан к применению,

- если у Вас непереносимость ибупрофена или других ингредиентов **Долормина для детей** (аллергия).
- если у Вас после приёма ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противовоспалительных средств наблюдались астматические приступы, отёки слизистой носа или кожные реакции.
- при имеющихся или ранее наблюдававшихся желудочно-кишечных язвах или желудочно-кишечных кровотечениях.
- если Вы страдаете тяжёлыми нарушениями функции печени или неконтролируемыми нарушениями сердечной деятельности.
- в последние три месяца беременности.
- при больших потерях жидкости (при рвоте, поносе или недостаточном приеме жидкости)

Грудные дети:

- **грудными детьми** до 6 месяцев в связи с отсутствием достаточных данных о применении лекарства в этой группе детей.

Важная информация о дополнительных ингредиентах препарата Долормин для детей:

Препарат содержит сахарозу (в 5 мл около 0,13 хлебных единиц), что необходимо учитывать, если Вы соблюдаете диабетическую диету.

Вы должны избегать приёма сахарозы, если Вы страдаете редкой наследственной непереносимостью фруктозы, врожденной малабсорбцией глюкозы – галактозы или недостаточностью ферментов сахаразы и изомальтазы.

Препарат содержит глицерол. Разовые дозы по 10 мл и более или вызвать головную боль и желудочно-кишечные расстройства.

3. Как принимать **Долормин для детей**?

Принимайте **Долормин для детей** строго в дозировках, указанных в данной аннотации. В сомнительных случаях проконсультируйтесь у врача или фармацевта.

Ниже приведена стандартная схема прёма препарата (если врач не

	Возраст (или вес тела)	Разовая доза	Максимальная суточная доза
	Дети от 6 месяцев до 2 лет (5 Ц 12 кг)	2,5 Ц 5 мл (соответствует 50 Ц 100 мг ибупрофена)	до 15 мл (соответственно до 300 мг ибупрофена)
	Дети от 3 до 5 лет (13 Ц 19 кг)	5 мл (соответствует 100 мг ибупрофена)	до 20 мл (соответственно до 400 мг ибупрофена)
	Дети от 6 до 9 лет (20 Ц 29 кг)	10 мл (соответствует 200 мг ибупрофена)	до 30 мл (соответственно до 600 мг ибупрофена)
	Дети от 10 до 12 лет (30 Ц 43 кг)	10 мл (соответствует 200 мг ибупрофена)	до 40 мл (соответственно до 800 мг ибупрофена)

назначил другой дозы):

Интервал между приёмами максимальных разовых доз должен составить не менее 4 часов.

Перед приёмом сильно встряхните прилагаемый мерный стаканчик.

Суспензия может приниматься независимо от прёма пищи. Пациентам с нарушениями функции желудка рекомендуется принимать **Долормин для детей** во время еды.

Пожалуйста, обратитесь к врачу или фармацевту, если у Вас складывается впечатление о слишком сильном или недостаточном действии **Долормина для детей**.

Без врачебного контроля принимайте **Долормин для детей** не более 3 – 4 дней.

4. Какие возможны побочные действия?

Как любые другие препараты, Долормин для детей может иметь побочные действия. Ниже приводятся наиболее значимые:

Желудочно-кишечный тракт:

Иногда:

- желудочно-кишечные расстройства: изжога, боли в животе, тошнота.

Нервная система:

Иногда:

- головные боли.

Реакции повышенной чувствительности:

Иногда:

- Реакции повышенной чувствительности с кожными высыпаниями, кожным зудом, а также астматические приступы (при этом возможно резкое падение давления).

5. Как хранить **Долормин для детей**?

Препарат хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке/флаконе.

Препарат хранится при комнатной температуре до 6 месяцев после вскрытия флакона.

* В дальнейшем сокращено как **Долормин для детей**

Долормин для детей, 4% суспензия ибупрофена

Показания к применению: слабые и умеренные боли, такие, как головная и зубная боль, повышенная температура
Относительно противопоказаний и возможных побочных действий – ознакомьтесь с аннотацией и проконсультируйтесь у врача или фармацевта.

Информация составлена в ноябре 2004 года. McNeil GmbH & Co. oHG, 53587 Bad Honnef

Предлагаем Вам наиболее важные рекомендации по приёму препарата *Долормин для детей*. Нижеследующая информация действительна исключительно в случае назначения препарата детям.

Подробную информацию о приёме данного препарата Вы можете получить, прочитав немецкую инструкцию по применению или обратившись к врачу или фармацевту.

Препарат можно приобрести без рецепта. Для достижения максимально успешного эффекта лечения необходимо принимать *Долормин для детей*, 4% суспензию ибупрофена, строго по предписанию.

Долормин для детей, 4% суспензия ибупрофена

Состав:

В 5 мл суспензии содержится 200 мг ибупрофена.

Прочие ингредиенты: Сахароза, глицерол, сорбитол, кукурузный крахмал, бензоат натрия, ксантановая смола, лимонная кислота (Ph. Eur.), полисорбат 80, очищенная вода, краситель Аллюра красный (E 129), ароматизаторы.

5 мл суспензии содержат приблизительно 0,14 ХЕ

Долормин для детей выпускается в упаковках по 100 мл суспензии

1. Что такое *Долормин для детей* и каковы показания для его применения?

Долормин для детей – это болеутоляющее, противовоспалительное и жаропонижающее средство (нестероидное противовоспалительное и анальгетическое средство).

Долормин для детей принимается при:

- слабых и умеренных болях, таких, как головная и зубная боль
- повышенной температуре

2. Что необходимо учитывать перед приёмом или назначением *Долормина для детей*?

Долормин для детей противопоказан к применению,

- если у Вас непереносимость ибупрофена или других ингредиентов *Долормина для детей* (аллергия).
- если у Вас после приёма ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противовоспалительных средств наблюдались астматические приступы, отёки слизистой носа или кожные реакции.
- при имеющихся или ранее наблюдавшихся желудочно-кишечных язвах или желудочно-кишечных кровотечениях.
- если Вы страдаете тяжёлыми нарушениями функции печени или почек, а также серьёзными неконтролируемыми нарушениями сердечной деятельности.
- в последние три месяца беременности.
- при больших потерях жидкости (при рвоте, поносе или недостаточном приеме жидкости).

Грудные дети и дети младше 3 лет:

- не показано назначение препарата детям до 3 месяцев ввиду отсутствия достаточных данных о применении лекарства в этой группе детей.
- не разрешается самостоятельное, без назначения врача, лечение препаратами, содержащими ибупрофен, грудных детей от 3 до 6 месяцев.

Для детей младше 3 лет предлагаются другие, более удобные для дозирования формы выпуска препарата.

Важная информация о дополнительных ингредиентах препарата *Долормин для детей*:

Долормин для детей, 4% суспензия ибупрофена

Показания к применению: слабые и умеренные боли, такие, как головная и зубная боль, повышенная температура
Относительно противопоказаний и возможных побочных действий – ознакомьтесь с аннотацией и проконсультируйтесь у врача или фармацевта.

Информация составлена в ноябре 2004 года. McNeil GmbH & Co. oHG, 53587 Bad Honnef


Препарат содержит сахарозу и сорбитол (в 5 мл около 0,14 хлебных единиц), что необходимо учитывать, если Вы соблюдаете диабетическую диету.

Вы должны избегать приёма сахарозы и сорбитола, если Вы страдаете редкой наследственной непереносимостью фруктозы, врожденной малабсорбцией глюкозы – галактозы или недостаточностью ферментов сахаразы и изомальтазы.

3. Как принимать *Долормин для детей*?

Принимайте *Долормин для детей* строго в дозировках, указанных в данной аннотации. В сомнительных случаях проконсультируйтесь у врача или фармацевта.

Ниже приведена стандартная схема прёма препарата (если врач не назначил другой дозы):

	Возраст (или вес тела)	Разовая доза	Максимальная суточная доза
	Дети от 3 до 5 лет (13 Ц 19 кг)	2,5 мл (соответствует 100 мг ибупрофена)	до 10 мл (соответственно до 400 мг ибупрофена)
	Дети от 6 до 9 лет (20 Ц 29 кг)	5 мл (соответствует 200 мг ибупрофена)	до 15 мл (соответственно до 600 мг ибупрофена)
	Дети от 10 до 12 лет (30 Ц 43 кг)	5 мл (соответствует 200 мг ибупрофена)	до 20 мл (соответственно до 800 мг ибупрофена)

Интервал между приёмами максимальных разовых доз должен составить не менее 4 часов.

Перед приёмом сильно встряхните флакон! Для точного дозирования используйте прилагаемый мерный стаканчик.

Суспензия может приниматься независимо от прёма пищи. Пациентам с нарушениями функции желудка рекомендуется принимать *Долормин для детей* во время еды.

Пожалуйста, обратитесь к врачу или фармацевту, если у Вас складывается впечатление о слишком сильном или недостаточном действии *Долормина для детей*.

Без врачебного контроля принимайте *Долормин для детей* не более 3 – 4 дней.

4. Какие возможны побочные действия?

Как любые другие препараты, *Долормин для детей* может иметь побочные действия. Ниже приводятся наиболее значимые:

Желудочно-кишечный тракт:

Иногда:

- желудочно-кишечные расстройства: изжога, боли в животе, тошнота.

Нервная система:

Иногда:

- головные боли.

Реакции повышенной чувствительности:

Иногда:

- Реакции повышенной чувствительности с кожными высыпаниями, кожным зудом, а также астматические приступы (при этом возможно резкое падение давления).

5. Как хранить *Долормин для детей*?

Препарат хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке/флаконе. Препарат хранится при комнатной температуре до 9 месяцев после вскрытия флакона.

* В дальнейшем сокращено как *Долормин для детей*